便秘中医症状评分表								
姓名		电话: 职业:	性别		年龄		病程	
 主症		  计分标准	一诊:		二诊:	<i>(</i> )	三诊:	
			分值	<u>备注</u>	分值		分值	备注
气虚秘	排便无力	<del>上帝(0万)之明並征从</del>   轻(2分)排便稍觉费力						
		中(4分)需努挣才能排出大便						
		重(6分)临厕努挣仍不能排出,需使用其他						
		方法辅助						
	腹中隐隐 作痛,喜 揉喜按	正常(0分)无明显症状						
		轻(2分) 偶有轻微腹胀腹痛中(4分) 腹胀腹痛较重, 但能忍受	-					
		重(6分)剧烈腹胀腹痛,不能忍受,需服药						
		控制						
阴虚秘	大便干结 如羊屎	正常(0分) 无明显症状	<b>.</b>					
		轻(2分)偏硬,1次/日 中(4分)落体,原源。0.0日上海12年	.					
		中(4分)硬结,便难,2-3日大便1次重(6分)硬结,伴腹胀,难解异常,3日以上						
		重(6分)使结,件废旅,准解开吊,3口以上  大便1次						
		正常(0分)无明显症状						
	口干欲饮	轻(2分)偶觉口干,饮水量增加不明显						
		中(4分)有时口干、饮水量较平时增加1/2-1						
		倍 (a)	.					
		<u>重(6分)口干明显、饮水量增加1倍以上</u> T	  一诊:		二诊:		  三诊:	
	次症	计分标准	分值	<u>备注</u>	<u>ール・</u> 分值	 备注	<u>一</u>       分值	 备注
气虚秘		正常(0分) 无明显症状	,		,,,			H
	乏力懒言	轻(1分)劳则即乏,不喜多言						
		中(2分)动则即乏,懒于言语						
		重(3分)不动亦乏,不欲言语 正常(0分)无明显症状	$\vdash \vdash \vdash$					
	食欲不振	丘帝(0万) 尤奶亚症状   轻(1分) 时有饥饿惑,但食且无减少						
		中(2分)经常有饥饿感,且食量减少1/3以	1					
		上, 2/3以下						
		重(3分)整日有饥饿感,且食量减少2/3以上						
阴虚秘	手足心热	正常(0分) 无明显症状	. ─					
		轻(1分)手足心发热,时有时无	.					
		中(2分) 手足心发热, 手足需暴露 重(3分) 手足心发烫, 欲接触冷物						
	形体消瘦	正常(0分)无明显症状						
		轻(1分)形体轻度消瘦						
		中(2分)形体中度消瘦	]					
		重(3分)形体极度消瘦	$\sqcup \sqcup$					
	心烦少眠	正常(0分)无明显症状						
		轻(1分)烦躁,每日睡眠不足4~5 小时,易醒						
		中(2分)易怒,每日睡眠不足2-3小时,入睡  困难						
		重(3分)情绪不能自控,彻夜难眠						
		总分						
患者签名								
操作者签名								
					1			